Chevalier à pattes jaunes
Tringa flavipes

Migrateur non nicheur, parfois présent en grand nombre sur les étangs. Dos gris-brun mouchetée de blanc. Striée sur les flancs et la poitrine. Les pattes sont jaunes. Taille de 25 cm.

Échasse d'Amérique
Himantopus mexicanus

Résident /migrateur, nicheur. Parfois présent en grand nombre sur les étangs. Noir sur e dos, l'arrière du cou et le dessus de la tête. Le ventre est blanc. Le bec est noir, les pattes sont rose rougeâtre. Taille de 39 cm.

Casse-burgos
Haematopus palliatus

Résident, nicheur sur les îlets. Dos brun grisâtre. Tête, cou et poitrine noir. Le bec est rouge vermillon, avec l'extrémité noire chez les jeunes. Les yeux sont rouges et jaunes. Les pattes sont couleur chair. Se nourrit de mollusque. Taille de 44 cm.

Dans ce prospectus nous vous présentons 13 espèces parmi les plus communes des 55 espèces d'oiseaux de mangroves et du littoral répertoriées à Saint-Barthélemy. Les oiseaux font partie des animaux les plus populaires chez les amoureux du monde animal, les forêts xérophiles et prairie de l'île peuvent faire le bonheur des ornithologues aguerris comme des simples curieux de la nature.

Canard des Bahamas
Anas bahamensis

C'est le seul canard sauvage résidant et nicheur de l'île. Plumage beige, tacheté de noir. Joue et face avant du cou blanc. Le bec est gris foncé avec un triangle rouge vers la base. Jusqu'à 51 cm. Il est trouvé aussi bien dans l'eau douce que l'eau salée.

Photographies : © Karl Questel

AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT ST BARTHÉLEMY

BP 683 Gustavia
97099 Saint-Barthélemy

BUREAU +590 590 27 88 18
URGENCE : +590 690 31 70 73
contact@agence-environnement.fr

FAUNE

QUELQUES OISEAUX DE MANGROVES ET DU LITTORAL DE ST. BARTH

AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT ST BARTHÉLEMY

Grande Aigrette
Ardea alba

Migrateur non nicheur. Grand oiseau, très remarquable par sa grande taille et son plumage blanc. Son bec est jaune et ses pattes sont noires. Envergure de 140 à 170 cm. Observé près de l'eau mais aussi loin à l'intérieur des terres chassant des insectes et des reptiles.

Poule d'eau des Antilles
Gallinula galeata ssp. *cerceris*

Résident et nicheur. Sous-espèce des Antilles et de la Floride. Plumage gris ardoise, plus sombre sur le dos. Ailes liserées de blanc. Le dessous de la queue est blanc. Les pattes sont jaunes avec de très longs doigts. Plaque frontale rouge. bec rouge avec l'extrémité jaune. Taille 38 cm.

Chevalier grivelé
Actitis macularius

Migrateur non nicheur, très commun sur le littoral. Hors période de reproduction, le dos est brun-gris barré de brun foncé. Le ventre est blanc. En période de reproduction le ventre est moucheté de noir. Taille de 20 cm. Ce distingue facilement des autres limicoles par des hochements frénétiques de la queue.

Tchô - Héron vert
Butorides virescens

Résident et nicheur, très commun dans tous les habitats. Petit héron a l'allure ramassée. L'adulte a le dos est vert sombre métallique. Sur les ailes des motifs en forme d'écailles. Les joues et le cou sont roux. Les jeunes sont comme les adultes mais avec les joues et le cou striées de blanc. Envergure de 62 à 70 cm.

Pluvier kildir
Charadrius vociferus

Résident /migrateur, nicheur. Dos brun grisâtre, parfois roux. Ventre blanc. Cou avec deux colliers noirs. Yeux bordés d'orange. Les pattes sont couleur chair. Taille de 26 cm. Fréquente les étangs et le littoral mais aussi les prairies.

Tournepierre à collier
Arenaria interpres

Migrateur non nicheur, visible sur les côtes. Hors période de reproduction le dos et brun grisâtre tacheté de noir et de blanc, le ventre est blanc, la poitrine est grise estampée. En période de reproduction le dos est noir et fauve, la tête est noire et blanche, la poitrine est noire. Taille de 26 cm. Ce distingue facilement des autres limicoles par ces pattes orange vif.



Crabier - Bihoreau violacé
Nyctanassa violacea

Héron nocturne, assez commun, résident et nicheur. Chez l'adulte, le plumage bleu-gris, strié de noir sur les ailes. Tête noire avec une couronne et une bande sur chaque jour blanc-beige. Les jeunes sont bruns, striés de clair. Les yeux sont rouges. Envergure de 101 à 112 cm.



Pluvier semipalmé
Charadrius semipalmatus

Migrateur non nicheur, assez commun sur le littoral. Dos brun, ventre blanc. Cou avec un seul collier noir. Les pattes sont jaune-orangé. Se distinguent des autres Charadrius par son petit bec bicolor, orange avec la pointe noire. Taille de 19 cm.

Bécasseau semipalmé
Calidris pusilla

Migrateur non nicheur. Dos gris-brun avec des stries sombres. Ventre blanc grisâtre. Ses pattes noires le distinguent, entre autres, d'un autre limicole similaire, le Bécasseau minuscule (*Calidris minuta*). Taille de 15 cm.