



Teurte
Tourterelle à queue carrée
Zenaida aurita

L'oiseau le plus commun de l'île. Brun clair avec des taches noires et blanches, la gorge est irisée de violet. Sa taille est généralement de 31 cm. Son alimentation est principalement granivore.

Dans ce prospectus nous vous présentons 13 espèces parmi les plus communes des 62 espèces d'oiseaux terrestres répertoriées à Saint-Barthélemy. Les oiseaux font partie des animaux les plus populaires chez les amoureux du monde animal, les forêts xérophiles et prairie de l'île peuvent faire le bonheur des ornithologues aguerris comme des simples curieux de la nature.

FAUNE

QUELQUES
**OISEAUX
TERRESTRES**
DE ST. BARTH



Ramier à couronne blanche
Patagioenas leucocephala

Grand pigeon élancé. Gris foncé, avec des barres iridescentes vertes à l'apparence écailleuse sur le cou, une couronne blanche sur le sommet de la tête. Sa taille est généralement de 40 cm. Son alimentation est principalement frugivore.



Colibri huppé - Fufou
Orthorhyncus cristatus

Petit colibri de 9 cm. Le dos est vert foncé avec des iridescences vert métallisé. Le mâle porte une huppe verte avec des reflets bleus. Le ventre est noirâtre chez le mâle, gris clair chez la femelle. Son alimentation est principalement nectarivore, parfois insectivore. Le nid est souvent réalisé avec des toiles d'araignées.



Ramier à cou rouge
Patagioenas squamosa

C'est le plus gros pigeon sauvage de l'île. Apparencé plus massive que le Ramier à couronne blanche. Le corps est gris ardoise, tête et cou marron rougeâtre, iridescence rouge-mauve à l'apparence écailleuse sur le cou. Sa taille est généralement de 41 cm. Son alimentation est principalement frugivore.



Photographies : © Karl Questel



BP 683 Gustavia
97099 Saint-Barthélemy

BUREAU +590 590 27 88 18
URGENCE : +590 690 31 70 73
contact@agence-environnement.fr





Sucrier à ventre jaune
Coereba flaveola ssp. bartholemica

Petit passereau commun. Chez cette sous-espèce, le dos est noirâtre, la poitrine est jaune vif. La tête est noirâtre avec un gros sourcil blanc sur chaque œil. Sa taille est généralement de 11 cm. Son alimentation est principalement nectarivore, parfois insectivore.



Paruline jaune
Setophaga petechia ssp. bartholemica

Ne vis qu'à proximité des mangroves sur St. Barth. Chez cette sous-espèce, le dos est jaune verdâtre, le ventre jaune avec des stries rougeâtres. Le mâle porte une marque rougeâtre sur le dessus de la tête lors des parades. Sa taille est généralement de 12 cm. Son alimentation est principalement insectivore.



Gli-gli
Crécerelle des Antilles de l'Est.
Falco sparverius ssp. caribaeorum

Petit faucon résident commun. Chez cette sous-espèce de Porto Rico et des Petites Antilles : Dos roux, ventre blanc-roux. Bandeau gris-bleu sur le front et les tempes. Le mâle se distingue de la femelle par une bande gris-bleu sur l'aile. Sa taille est généralement de 60 cm. Son alimentation est principalement insectivore et carnivore.



Sporophile rougegorge
Loxigilla noctis ssp. ridgwayi

Petit passereau assez commun. Chez cette sous-espèce, le mâle est noir, avec la gorge, les sourcils et le croupion rouge. La femelle est marron, avec le croupion orange. Sa taille est généralement de 14 cm. Son alimentation est principalement granivore et nectarivore.



Pipirite - Tyran gris
Tyrannus dominicensis

Oiseau généralement diurne, peut chasser la nuit sous les lumières artificielles. Le dos est gris foncé, le ventre blanc, les ailes et la queue sont noirâtres. Il semble porter un masque noir. Sa taille est généralement de 25 cm. Son alimentation est principalement insectivore. Réputé pour sa pugnacité face aux oiseaux bien plus grands que lui, il est souvent visible sur les lignes électriques.



Balbuzard - Malfini
Pandion haliaetus

Gros rapace piscivore migrateur. Dos brun foncé, poitrine blanche. Tête pâle avec un bandeau noir sur l'œil. Souvent appelé aussi "aigle" sur l'île. Peut être observé lors de sa migration autour des étangs et des îlets.



Sporophile Cici
Melanospiza bicolor

Petit passereau peu commun. Ressemble beaucoup au Sporophile rougegorge. Le mâle est brun-vert sur le dos, la tête et la poitrine gris foncé. La femelle est brun-vert olive. Sa taille est généralement de 12 cm. Son alimentation est principalement granivore.



Loui'Y6 - Moqueur corossol
Margarops fuscatus

Ressemble à une grive. Dos marron, ventre blanc avec des motifs marron ressemblant à des écailles. Longues pattes, il se déplace souvent en sautant. L'iris est grise, lui donnant un air sévère. Chant mélodieux, audible parfois de nuit. Sa taille est généralement de 30 cm. Son alimentation est omnivore.



Hirondelle rustique américaine
Hirundo rustica ssp. erythrogaster

Petit migrateur commun, au vol rapide et la queue fourchue. Chez cette sous-espèce, le dos est noir avec iridescence bleue. Ventre blanc-roux à roux. Front et gorge rouge. Sa taille est généralement de 18 cm. Ils peuvent être observés en grand nombre chassant les insectes à la surface de la mer.